

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LARROUZE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

FOLLET et SACQUÉPÉE. Sur les septicémies en général et les septicémies méningococciques en particulier.

E. VIDAL. Quelques points de la séméiologie urinaire des opérés.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Résection du ganglion de Gasser pour névralgie du trijumeau; résultats éloignés. — Chirurgie de l'estomac. — Pancréatite aiguë. — Actinomycose pulmonaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Cathétérisme urétéral avec le cystoscope à vision directe. — Tumeur polykystique de l'ovaire. — Epiplocele inguinale. — Ulcération gastrique au niveau d'une veine variqueuse au cours d'une cirrhose latente. — Cancer chez le chien. — Hydronéphrose chez le cheval. — Néphrite chez le chien. — Fracture de la rotule. — Luxation du pouce. — Prix Godard. — Elections.

Académie des sciences. — Action de l'invertine dans un milieu hétérogène. — L'hordénine alcaloïde nouveau, extrait des germes de l'orge. — La toxicité de l'hordénine. — Les échinodermes recueillis par l'expédition de M. Charcot. — La cryoscopie des eaux minérales.

Société de pédiatrie. — Anévrisme de l'aorte chez une jeune fille de quatorze ans. — Adénopathie trachéo-bronchique. — Méningite cérébro-spinale guérie sans séquelles. — Action eupeptique du citrate de soude dans la seconde enfance. — Elimination de l'urée dans la rougeole suivant les régimes. — Méningite cérébro-spinale traitée avec succès par les injections intrarachidiennes de collargol. — Hémiplegie au cours d'une fièvre typhoïde chez un enfant de neuf ans. — Ostéomyélite chez un nourrisson.

Société de chirurgie. — A propos du meilleur mode de drainage dans les péritonites appendiculaires. — Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. — Paralysie cubitale et radiale traitée opératoirement et guérie. — Pince hémostatique. — Corps étrangers du tube digestif. — Tumeur maligne de l'ovaire dans un cas de pseudo-hermaphrodisme féminin. — Pièce d'épiloite. — Sur le mode de production des rétrécissements intestinaux à la suite des hernies étranglées. — Elections.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIER

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL

Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

XIV^e ANNÉE. — N° 6, 20 JANVIER 1906.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — C. FIELD. Sur les corps trouvés dans la peau ou la sérosité des scarlatineux et des rubéoleux.

Bactériologie. — H. HUBER. Les effets de la lumière sur les bactéries et leurs produits en solution avec l'éosine ou l'érythrosine. — FIGARI et PORRINI. L'action empêchante des sérums normaux et thérapeutiques sur le développement du bacille de la tuberculose. — J. TORREY. Etude des différents bacilles de la dysenterie.

Médecine. — BRAUN et MAROTTE. Note sur le diagnostic précoce des oreillons. — COSTE. Manifestations cutanées du paludisme; roséole palustre.

Chirurgie. — W. S. THAYER. Observations sur plusieurs cas de pancréatite aiguë.

Pédiatrie. — G. BOSCH. Les intoxications médicamenteuses chez l'enfant. — F. HAMBURGER et E. SLUKA. Contribution à l'étude de la tuberculose de l'enfance. — P. NOBÉCOURT et A. DE VICARIS. Recherche sur la flore bactériologique de la bouche normale chez les enfants pendant le premier mois et au moment de l'éruption dentaire.

Neurologie et Psychiatrie. — R. LEROUX. La névrite spinale d'origine otique. — M. CHAILLY. Séquelles nerveuses de la méningite cérébro-spinale épidémique. — L. INGELTRANS. Le syndrome de Möbius (akinesia algera).

Obstétrique. — B. P. WATSON. Recherches expérimentales sur les conséquences, sur le fœtus et sur le placenta, de l'évacuation du liquide amniotique.

Stomatologie. — J. GAREL et S. BONNAMOUR. De la hernie intermittente des glandes salivaires comme signe de calcul.

Électricité médicale. Radiologie. — CALABRESE. Sur l'action des rayons de Röntgen sur le virus de la rage.

CHRONIQUE

S. I. DE JONG. Du rôle respectif des différents insectes dans la transmission de la peste.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

Sterilisation des sondes élastiques.

LIVRES NOUVEAUX

M. DEGUY et A. GUILLAUMIN. Traité de microscopie clinique. — R. LÉPINE. Les complications du diabète et leur traitement.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

J. D. Le collargol dans le traitement de l'appendicite.

NOUVELLES

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée. H. FLACH, 8, rue de la Gossonnerie, PARIS.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^{le}

4⁵⁰ Toutes Pharmacies

ROGIER

DU RÔLE RESPECTIF

DES DIFFÉRENTS INSECTES

DANS LA TRANSMISSION DE LA PESTE

Les discussions sont loin d'être closes sur le rôle des différents insectes dans la propagation de la peste. Les uns incriminent surtout les puces, qui couvrent les cadavres des rats pesteux, les autres accusent les moustiques, d'autres les punaises. Etant donnée l'importance pratique considérable qu'il y a pour la prophylaxie du fléau à posséder des notions fermes sur ce chapitre difficile à éclairer, nous croyons intéressant de rapporter les expériences de W. Hunter, bactériologiste du gouvernement à Hong-Kong, expériences qui l'ont amené à des conclusions un peu différentes des notions couramment admises (*Centralblatt f. Bakteriologie*, originale, 1905, 24 Novembre, Bd XL, H. 1, p. 43-56).

Hunter a eu l'occasion en 1903 et 1904 de voir un nombre considérable de pestiférés à l'hôpital des maladies infectieuses. Il a donc fait porter ses recherches, et sur des insectes recueillis dans les salles où couchaient ces malades, et dans la partie du cimetière où les cadavres des pestiférés étaient exposés.

Il a, en premier lieu, essayé de vérifier expérimentalement si le bacille pesteux était transporté par la surface du corps des insectes, des mouches notamment. Après avoir recueilli des mouches à l'hôpital et au cimetière, il les trempait dans du sérum stérile ou dans du bouillon. Puis ce sérum et ce bouillon dans lequel on avait aussi lavé les mouches était, soit cultivé sur des plaques de Pétri, soit répandu et frotté à la surface de la peau rasée de cobayes (ce dernier pro-

GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

WARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL

LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits et demande. Kœhly, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA

Médication iodée intensive GRANULÉ STABLE Agréable, parfaitement tolérée, 8cgr. d'iodure par cuill. à café.

Ph^{ie} PÉLOULE, 2, Faub^{ie} S^{te} Denis, Paris. Échantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

bouche, le troisième qu'on laisse ouvert. Les sondes passées dans le couvercle intérieur plongent dans l'intérieur de la caisse métallique, dont le fond est rempli par une certaine quantité, 100 centimètres cubes, d'une solution de formoline officinale à 1 ou 2 pour 100 dans de l'eau distillée. Une quatrième ouverture où passe un thermomètre, et un robinet situé à la partie inférieure, complètent l'appareil, chauffé par une flamme quelconque, bec Bunsen ou forte lampe à alcool. L'ensemble rappelle l'étuve de d'Arsonval des laboratoires.

On chauffe donc la partie inférieure de la caisse, qui renferme la solution de formoline. Les vapeurs s'échappent par l'orifice laissé ouvert dans le couvercle extérieur, la température de ces vapeurs étant vérifiée par les deux thermomètres supérieurs et inférieurs. Les sondes passées dans les trous du couvercle intérieur baignent donc dans ces vapeurs, auxquelles on les laisse exposées, jusqu'à ce que les thermomètres montent à 70 ou 75°. A ce moment, c'est-à-dire très rapidement, on éteint le brûleur, et on laisse refroidir après avoir fermé l'orifice supérieur du couvercle extérieur. Par ce procédé la stérilisation et le nettoyage des sondes seraient parfaits, et les sondes ne seraient nullement abimées. On pourrait, d'après Sittler, se servir de ce procédé également pour les sondes gastriques, les brosses, etc.

Si le procédé n'est pas absolument nouveau, et si beaucoup de chirurgiens se servent de procédés analogues, nous avons cru devoir le signaler à cause du nombre d'expériences bactériologiques de contrôle rapportées dans le mémoire de Sittler; il a comparé le degré de stérilisation obtenu par les procédés les plus employés actuellement, avec celui obtenu par son procédé et ses expériences bactériologiques se recommandent du contrôle du professeur Jäger.

LIVRES NOUVEAUX

M. Deguy et A. Guillaumin. — *Traité de microscopie clinique*. 1 vol. gr. in-8° de 427 pages, avec 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. Paris, 1906. Prix : 50 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Les constants progrès des sciences médicales ont complètement transformé nos moyens d'investigation clinique. A côté de l'analyse des urines, dont l'usage est entré dans la pratique usuelle, il convient de placer la microscopie clinique. Tout praticien doit savoir rechercher les principales bactéries pathogènes, il doit savoir examiner un sédiment urinaire, pratiquer un sérodiagnostic. Il doit, au moins, pouvoir contrôler les résultats qu'on lui fournit, être à même d'interpréter une préparation.

On a publié déjà un grand nombre de traités de bactériologie et de micrographie, mais la plupart de ces livres ou de ces manuels sont surtout utiles aux bactériologues ou aux histologistes de profession. Tout autre est le but poursuivi par MM. Deguy et Guillaumin. Leur ouvrage s'adresse au praticien et à ses collaborateurs éventuels, au pharmacien qui pourra se charger du côté technique et remettre au médecin des préparations. Ces préparations, il faut savoir les déchiffrer. Les microbes qu'on voit, il faut les rattacher aux espèces connues, travail difficile et long, même pour des bactériologues experts. Les descriptions données par les auteurs classiques sont complexes et souvent manquent de clarté. Qu'on s'adresse au livre de MM. Deguy et Guillaumin et la tâche deviendra facile. Les renseignements sont brefs, concis, mais suffisants. Pour chaque espèce microbienne, les caractères principaux sont résumés en une page ou deux. En regard de cette courte notice, se trouve une fort belle planche en couleur. Il suffit d'un examen rapide pour retrouver la bactérie qu'on veut déterminer. Les dessins sont tellement exacts et tellement parfaits qu'on croirait avoir sous les yeux de véritables préparations et des préparations bien réussies.

Si la bactériologie tient une large place dans le livre qui vient de paraître, les autres applications cliniques de la microscopie sont très soigneusement

exposées. C'est ainsi qu'on trouvera tous les renseignements utiles à l'examen du sang, à la différenciation des divers globules blancs, à la numération des globules rouges; puis viennent des chapitres consacrés à la recherche et à la détermination des cellules qui peuvent se trouver dans les exsudats, à l'examen du lait, des matières fécales, à la détermination des différents parasites animaux et végétaux. Les auteurs décrivent ensuite les procédés utilisables pour l'examen microscopique des crachats, des écoulements génitaux, des urines, pour la recherche du sperme. Enfin le livre se termine par quelques renseignements sur les empoisonnements que peuvent déterminer les champignons.

On voit par cette énumération que le *Traité de microscopie clinique* constitue une véritable bibliothèque. Cet ouvrage, à lui seul, remplacera tous les guides et manuels déjà publiés. Les auteurs ont donc rendu un grand service aux praticiens, aux pharmaciens, aux hommes de laboratoire, à tous ceux qui ont besoin de faire des examens microscopiques et ils ont trouvé des éditeurs qui n'ont rien ménagé pour assurer le succès de ce bel ouvrage.

H. ROGER.

R. Lépine. — *Les complications du diabète et leur traitement*, 1 vol. in-16 de 96 p. des « Actualités médicales ». Prix : 1 fr. 50 (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs).

Ce petit volume forme le complément de celui que M. Lépine a déjà consacré dans la même collection au diabète non compliqué et à son traitement. L'auteur après une étude de l'acétonémie et de la lipémie a groupé les complications si variées du diabète en complications viscérales de cause dyscrasique (rénales, cardiaques, vasculaires, coma, etc.), microbiennes et accidentelles. On trouvera à chaque page de cette monographie, traitée tout entière avec la compétence que peuvent donner des recherches personnelles approfondies et une longue expérience, une documentation considérable et au courant des travaux les plus récents.

PH. PAGNIEZ.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'Anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniiod.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TÉLÉPHONE 517-12

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.

3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMiques

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, Rue de Vienne, PARIS

(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF)

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1897 EN FRANCE 20 DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Toutes Pharmacies

THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE

Médications diurétiques :

LA SANTHÉOSE

Bien que la découverte de la théobromine date déjà de plus d'un demi-siècle, son histoire thérapeutique est relativement récente. Il a fallu les travaux de Germain Sée, de Hallopeau, et surtout de Huchard, pour assigner à cet excellent médicament la place qui lui était due. C'est en vain que certains thérapeutes se sont efforcés de lui substituer divers succédanés, entre autres l'agurine, la diurétine, la théocine, la théophylline : tout en ayant une activité moindre (Widal), ces substances ne sont point dépourvues de toxicité et exercent sur le rein une action souvent fort irritante (Pouchet, Geissler, Askanazy, etc.).

Toutefois, pour répondre à l'idéal voulu de constance thérapeutique et de parfaite innocuité, il importe que la théobromine remplisse trois conditions : sa pureté doit être irréprochable, son origine toujours identique, sa composition rigoureusement fixe.

Or, si maints auteurs ont reproché à ce médicament de déterminer avec assez de fréquence des céphalées, de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est précisément que la plupart des théobromines commerciales sont *défectueuses* comme composition et *variables* comme origine. C'est ainsi que, selon le prof. Pouchet, elles peuvent être extraites de plusieurs plantes, des thés, du cacao, etc., ce qui explique leur diversité d'action. D'autre part, les récentes analyses pratiquées sur l'ensemble des théobromines commerciales ont fixé ce point important : c'est qu'aucune d'elles n'est complètement exempte de *caféine* et que, pour certains, la proportion du mélange se montre élevée (Vadam). Enfin les recherches de M. Huchard ont permis de rattacher la cause des accidents toxiques à l'*adultération fréquente de la théobromine par des produits impurs*. « Le médicament, dit-il, ne donne lieu à des vomissements ou à des troubles digestifs que dans les cas où il est falsifié, ce qui malheureusement est loin d'être rare » (*Journ. des Prat.*, 22 févr.) Et plus loin : « Si, dans certains cas, la théobromine n'augmente pas considérablement la diurèse, ou si elle a été accusée de provoquer certains accidents toxiques, c'est qu'en raison de l'élévation de son prix et de sa provenance de l'étranger, elle est souvent adultérée. »

C'est en raison de ces déboires que les praticiens ont accueilli avec une faveur marquée la création de la *Santhéose*, diméthylxanthine à caractères spéciaux et d'une irréprochable pureté. Si régulière est son action, si remarquable est sa tolérance qu'on peut à bon droit la considérer, selon les expressions mêmes de M. Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Voilà plus de deux ans que la *Santhéose* est expérimentée à l'hôpital Necker; or, les résultats obtenus ont nettement mis en valeur son efficacité puissante, son absence de toxicité aux doses normales, son activité dénuée de tout pouvoir irritant sur le rein.

Dans toutes les maladies justiciables d'un diurétique rénal direct, les préférences des praticiens iront donc désormais à la

Santhéose, dont l'action est parfaitement définie, toujours semblable et régulatrice des grandes fonctions. C'est ainsi que dans les affections cardiaques et cardio-rénales, alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, elle fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles. Qu'il s'agisse de lésions valvulaires (insuffisance mitrale), d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la *Santhéose* est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur, pour ne s'adresser qu'aux reins.

D'autre part, il n'est pas d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal (*Presse médicale*) ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. Grâce à son emploi, les œdèmes diminuent, l'élimination des chlorures urinaires s'élève considérablement, l'albumine tombe à des quantités négligeables.

Dans l'artério-sclérose, elle solubilise le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux, suractive les combustions, ramène peu à peu à la normale les échanges intercellulaires.

Elle se montre enfin un médicament vraiment étiologique et spécifique dans l'arthritisme et la totalité de ses manifestations. Peu d'agents lui sont comparables dans le rhumatisme subaigu ou chronique, dans les accès de goutte, comme modificateur de l'uricémie, bref, pour combattre la diathèse urique dans toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires. C'est qu'en effet la *Santhéose*, surtout son association lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser, par l'émonctoire rénal, l'économie de ses urates et de ses déchets.

La *Santhéose* existe sous quatre formes, ayant chacune leurs indications spéciales, à savoir : 1° la *Santhéose pure*, à laquelle on aura recours dans les affections cardio-rénales, les albuminuries, l'urémie, l'hydropisie; — 2° la *Santhéose phosphatée*, plus spécialement indiquée dans la sclérose cardio-rénale, la neurasthénie, les convalescences; — 3° la *Santhéose caféinée*, qui convient le mieux dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, les infections; — 4° la *Santhéose lithinée*, qui constitue la médication par excellence de l'artério-sclérose, du rhumatisme, de la goutte, etc.

La *Santhéose* se présente sous forme de cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 50 centigrammes de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.

Détail important : pour éviter toute substitution ou contrefaçon, le médicament n'est ni vendu en vrac ni détaillé : il ne se présente que par boîte de 24 cachets. Chacun d'eux doit être revêtu de la marque « *Santhéose* », qui est la garantie de l'absolue pureté du médicament et, par suite, de son efficacité puissante.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le collargol dans le traitement de l'appendicite.

— Depuis cinq ans, M. MOOSBRUGGER, médecin en chef de l'hôpital de Lentkirch, a systématiquement soumis les cas d'appendicite, même les plus avancés, même les plus graves, au seul traitement médical par le collargol : or tous ces cas, au nombre de 80, se terminent par la guérison complète, exception faite de 2 cas dans lesquels il existait une péritonite diffuse tellement avancée que toute intervention, même chirurgicale, devait être vaine.

Le traitement consiste dans l'emploi exclusif et à hautes doses de collargol administré, soit par la bouche (une cuillerée à soupe d'heure en heure ou de demi-heure en demi-heure d'une solution aqueuse de collargol à 1 ou 1/2 pour 100), soit en frictions (2 grammes d'onguent Crédé 2 fois par jour), soit enfin en lavements (0 gr. 50 centigr. de collargol dans 100 grammes d'eau, 2 fois par jour); pour les enfants, doses moitié moindres.

Employé à temps, le traitement par le collargol amènerait dès le deuxième jour une amélioration de l'état général et des troubles locaux et un abaissement de la température, le ballonnement disparaîtrait au troisième jour. Dans les cas graves où il existe déjà un épanchement dans la cavité péritonéale et où il y a menace de péritonite diffuse, l'amélioration se produirait plus lentement, mais serait constante au bout de 4 à 8 jours; la résorption des abcès péri-appendiculaires demanderait des semaines. M. Moosbrugger prétend avoir guéri ainsi des cas désespérés. « On peut comparer, dit-il, l'action du collargol dans l'appendicite à celle du sérum antidiphthérique dans la diphthérie; on n'aura de mécomptes que dans les cas où la péritonite et, partant, l'infection et l'intoxication générale seront déjà trop avancées. » (*Münch. mediz. Wochenschr.*, 1905, n° 37.) J. D.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. A. GUINARD, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, commencera un cours

de clinique annexe de la Faculté à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Desault) le jeudi 25 Janvier, et le continuera les jeudis suivants à la même heure. Première leçon sur « les Devoirs des élèves dans les hôpitaux ».

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUISEZ, ancien interne des hôpitaux, recommencera son *Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie*, le mardi 6 Février, à 3 h. 1/2, et le continuera les mardis, jeudis, samedis à la même heure.

Le cours sera essentiellement pratique et comprendra 12 leçons. (Examen des malades, maniement des instruments spéciaux, petites opérations.)

Droits d'inscription 50 francs.

S'inscrire les mardis et samedis de 4 heures à 5 heures à la consultation de laryngologie de l'hôpital.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé militaire. — Sont nommés à l'emploi de médecin stagiaire à l'Ecole d'application du service de santé militaire, MM. Barthès, Vincent, Wickersheimer, Homolle.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Vallot, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir à l'établissement de la marine à Indret.

— Sur la proposition du conseil de santé du port de Toulon, M. le médecin de 2^e classe Fourgous a été distrait de la liste d'embarquement pour une période de six mois, à compter du 6 Janvier 1906.

— M. le médecin en chef de 2^e classe Jan, du port de Toulon, est désigné pour occuper la prévôté de médecin résident à l'hôpital de Saint-Mandrier.

— M. le médecin principal Bourit, du port de Toulon, est désigné pour embarquer, le 1^{er} Février prochain, sur le *Bouvet* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 1^{re} classe Denis, du port de Brest, est désigné pour continuer ses services au 2^e dépôt des équipages de la flotte à Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Chartres, du corps d'occupation de Chine, a été placé hors cadres (en mission pour le service) et mis, à compter du 15 du même mois, à la dis-

position de la Société franco-belge d'études de chemin de fer en Chine.

— M. le médecin-major de 1^{re} classe Allain, en congé de convalescence, hors cadres, a été désigné pour remplir, dans la position d'activité, hors cadres, les fonctions de chef du service de santé au Moyen-Congo.

La lutte contre la Tuberculose. — Le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération en vue d'ouvrir un crédit de 2.400 francs destiné à rémunérer les travaux supplémentaires occasionnés au personnel des architectes-voyers et du Casier sanitaire des maisons de Paris par l'enquête entreprise, à la demande de la Commission spéciale de la tuberculose, dans les maisons reconnues comme des foyers permanents de cette maladie.

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques. — La Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques doit se réunir vers la fin de Février prochain, pour élaborer le programme de ses travaux.

Un hommage à M. Ch. Monod. — Les élèves, les collègues et les amis de M. Charles Monod ont l'intention de lui offrir, à l'occasion de sa retraite de chirurgien des hôpitaux, une médaille commémorative, dont l'exécution a été confiée à M. Charpentier.

M. le professeur Guyon a bien voulu, dès à présent, accepter la présidence de la cérémonie qui, suivant le désir exprimé par M. Monod, aura un caractère de très grande simplicité.

Les souscriptions devront être adressées, avant le 28 Février, à M. P. Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité. Tout souscripteur d'au moins 25 francs recevra un exemplaire en bronze de la médaille.

Il n'a pas été possible d'offrir ce souvenir à M. Monod quand il a quitté l'hôpital Saint-Antoine; la médaille lui sera remise ultérieurement, et la date sera indiquée en temps utile pour permettre à tous ceux qui veulent donner à M. Monod ce témoignage d'affection, de s'associer à cette manifestation.

Le service du personnel à l'Administration centrale de l'Assistance publique. — A la suite de la désignation que nous avons annoncée de M. Caillens comme chef du service du personnel en remplacement de M. Lejars, le service vient d'être divisé en trois bureaux.

Premier bureau : Personnel administratif, M. Daumy, sous-chef.

Deuxième bureau : Personnel hospitalier, ouvrier, retraites et comptabilité, M. Durand, sous-chef.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int.
6 gr. 50 équivalent à 4 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE
à 33 %, pour inject. s. cut.
(2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)

BROMIPINE-MERCK
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES (englobées).

TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Doses : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants, de 1 à 2 et même plus, suivant indication du médecin.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours formuler

PILULES SIROP

ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER SCROFULE IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

Troisième bureau : Personnel médical, M. Aubert, sous-chef.

École d'application du service de santé militaire. — Un décret présidentiel rendu sur la proposition du ministre de la Guerre, élève de vingt-six à vingt-huit ans au 1^{er} Janvier de l'année du concours, la limite d'âge imposée aux pharmaciens de 1^{re} classe admis à concourir pour l'emploi de pharmacien stagiaire à l'Ecole d'application du service de santé militaire.

Médecins pour les Œuvres de mer. — Les Œuvres de mer demandent un médecin pour aller en Islande et en Terre-Neuve, durant le printemps et l'été de 1906. Départ vers le 1^{er} Mars, retour en Septembre. Traitement 1.200 fr. au départ, autant à l'arrivée.

Écrire à M. Pojo, administrateur-délégué des Œuvres de mer, 18, rue de la Trémoille, Paris.

La succession de M^{me} Grangier. — Les principales clauses du testament de M^{me} Grangier, qui vient de mourir instituant comme légataire universel l'hôpital général de Dijon, sont aujourd'hui connues.

Parmi les legs que, suivant la volonté de la testatrice, l'hôpital général de Dijon devra délivrer, nous relevons les suivants :

Au département de la Côte-d'Or, pour faire un sanatorium destiné aux tuberculeux, 100.000 francs.

A l'hôpital de Nuits-Saint-Georges, 150.000 francs.

A celui de Gevrey-Chambertin, 50.000 francs.

A l'Université de Dijon, 100.000 francs.

A l'institution des sourds-muets et aveugles de Dijon, 20.000 francs.

En résumé, le total des legs en argent, non compris les immeubles de Dijon, Vougeot, Gilly, Villecomte, Bessey et Beauvoisin, qui sont donnés à des particuliers, s'élève à 6.566.000 francs.

Les rentes à payer se montent à 45.750 francs, ce qui représente un capital de 1.500.000 francs.

Au total, pour les legs et les rentes, 8 millions.

La fortune étant évaluée à 20 millions, et M^{me} Ville-neuve, mère de M^{me} Grangier, héritant du quart, il resterait 7 millions à l'hôpital général de Dijon, qui aura à charge les droits de succession de tous les légataires.

Association professionnelle des médecins de Rouen. — Cette Société vient de renouveler son bureau pour l'exercice 1906. Ont été désignés : MM. Debout, président; Jeanne, vice-président; E. Delabost, secrétaire; Seyer, secrétaire.

Conférence d'Internat. — MM. G. LABEY, chef de clinique chirurgicale et JEAN CAMUS, ancien interne des hôpitaux, commenceront une conférence d'Internat le samedi

27 Janvier, à 2 h. 1/4 (Laboratoire des travaux pratiques de physiologie, à l'Ecole pratique). S'adresser à l'un d'eux.

CONCOURS

Médaille d'or (médecine). — Treize concurrents ont déposé leur mémoire pour ce concours. Ce sont MM. Taon, Verliac, Halbron, Chiray, Darré, Faure-Beaulieu, Lædérich, Lemaire (Henri), Flourens, Villaret, Ramon, Roussy, Trémolières.

Le lundi 12 Mars aura lieu à l'Hôtel-Dieu, à 4 heures la séance d'ouverture du concours.

Le jury est composé comme suit : MM. Barié, Lamy, Comby, Bécclère et Routier qui ont accepté.

Médaille d'or (chirurgie et accouchement). — Dix concurrents ont déposé un mémoire pour ce concours. Ce sont : MM. Martin, Okinczyk, Capette, Muret, De-comps (Pierre), Le Sourd, Desmarests, Rottelstein, Bréchet, Lardennois.

Le jeudi 8 Mars aura lieu à l'Hôtel-Dieu, à 4 heures, la séance d'ouverture du Concours.

Sont désignés pour faire partie du jury : MM. Cunéo, L. Fournier, Brindeau, qui ont accepté, et Nélaton, Poirier, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 16 Janvier. — Ont obtenu : MM. Molina, 2; Trocmé, 9; Dubosc, 12; Boucaut, 8; Grasset, 10; Couton, 7; Laroche, 11; Maguin, 5; Mignard, 4.

Séance du 17 Janvier. — Ont obtenu : MM. Chamard-Bois, 9; Jumentlé, 9; Boyé, 7; Périer (Romain), 6; Maillet, 7; Lemarignier, 7; Lerat (Georges), 6; Binet de Jassonneix, 10. — Absents : MM. Vaillant, Frick.

Séance du 18 Janvier. — Ont obtenu : MM. Ménard (Louis), 7; Morant, 2; Doury, 3; Salin, 5; Duval, 11; Houdard, 8; Tanzi, 2; Stern, 9; Hirtz, 4. — Absents : MM. Jean, Lascazas de Saint-Martin, Phélip.

Séance aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu, à 4 h. 35.

PATHOLOGIE. — Séance du 18 Janvier. — Ont obtenu : MM. Gautier (Jean), 7; Maurios, 7; Gérard, 6; Barré, 10; Railliet, 12; Duchet-Suchaux, 11; Couput, 6; Bazy, 13; Barbet, 10; Petiteau, 10. — Absents : MM. Halma-Grand, Prével.

La prochaine séance aura lieu le mardi 23 Janvier à 4 h. 45, à l'hôpital de la Charité.

Internat en pharmacie. — Un concours pour la nomination aux places d'élève interne en pharmacie vacantes au 1^{er} Juillet 1906 dans les hôpitaux et hospices

civils de Paris sera ouvert le mercredi 14 Mars 1906, à 10 heures du matin dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices, 47, quai de la Tour-nelle.

Les élèves qui désireront prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire à l'administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures depuis le jeudi 1^{er} Février jusqu'au samedi 24 du même mois inclusivement.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Ni irritant. — Ni toxique.

Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

Jolie Voiturette Rochet. Occasion, état de neuf. 4 1/2 aster. 3 pl., glace, capote, phare alpha, pneus Michelin, acc. de rech. et outill. complet. 2.000; photo. BRUGAND, 74, rue de la Victoire, Paris.

A vendre. — Voiture automobile Hotchkiss type F. Occasion, état de neuf, 15.000 francs. S'adresser HOFFMANN, 7, rue Saint-Claude.

Aide d'anatomie et ancien interne commenceront prochainement conférences privées d'Externat et d'Internat. Ecrire P. M., 223.

Cours pratique des maladies des voies urinaires.

— La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à six. Les examens des malades et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements, s'adresser ou écrire au D^r BANZET, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille.

Chef de clinique à la Faculté commencera vendredi 26 Janvier conférence d'Externat. S'adresser P. M., 222.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{is} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

M. René Gaultier, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, avec aide d'anatomie, reprendra sa conférence privée d'Internat à la fin de Janvier.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

BASS & CO'S

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

ETABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public

Décret du 18 Août 1897.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Duclaux, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »

Dr DEBIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE des FONTAINES (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.

DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : De 4 Cuillerées à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7^{fr}50. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4^{fr}50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE

DE LA

TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube
digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCEÏNE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par
cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à
0.02 centigr.
de NARCYL
par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.



Échantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**
chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Bruxelles 1897, Rouen 1898, Dijon 1898.

DOSES :

Adultes : 2 mesures;
Enfants : 1 mesure avant chacun
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4 f. 50

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bocon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —
4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont
l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en
Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline
saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stoma-
cale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les vrais Granules de Catillon, Prix de l'Académie de
Médecine pour l'aide des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Pharm.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE